

スタウト パーティート[®]
箱粒剤

病虫害の侵入を許さぬ強固な守り



は種時から使用可能で、いち病と
甲虫目・チユウ害虫に高い効果！



© 2005 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is printed on acid-free paper.

司馬圖藥時察旺經相煎藥水

スロートパライト 増殖剤


①いもち病と主要な水稲害虫に優れた効果

- ② 卑虫目・子ウ目害虫に対して高い効果を発揮 ③ は理前(1)から移植時まで使用可能

[illegible][illegible]


●

園いちご何 園いちご何



■ ちみ枝福商店(創業数代)

Month	Number of people (thousands)
Jan	2.5
Feb	3.0
Mar	3.5
Apr	4.0
May	4.5
Jun	5.0
Jul	5.5
Aug	6.0
Sep	6.5
Oct	7.0
Nov	7.5
Dec	8.0



■イネドロオロシムシ



■イナゴ類(コハネイナゴ)

AGE	PERCENT
18-24	10
25-34	15
35-44	20
45-54	25
55-64	30
65-74	35
75-84	40
85-94	45
95-104	50



2000年12月15日

「それでは、この本が、あなたに何を教えるのか、ということについて、もう一言だけお話ししたいと思います。この本は、あなたが、自分自身を、もっとよく知るための、一冊のガイドブックです。あなたが、自分自身を、もっとよく知ることができれば、あなたは、自分自身を、もっとよく愛することができます。そして、あなたは、自分自身を、もっとよく愛することが、あなたの人生を、もっとよく生きるための、唯一の方法です。」

「おれは、おれに注意してくれまい。」

[illegible]

● 貴社が得意先から、お心へく感謝状や贈り物を頂戴致しました。ご挨拶、ごくお礼。

JAグループ

廣州

協友アール株式会社
〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1
TEL: 03-5561-1111 FAX: 03-5561-1112
E-MAIL: info@kyu-eal.co.jp
URL: <http://www.kyu-eal.co.jp>

推獎

いもち・粟
相施用剤

病虫害防除剂


いもち病は、本田勝負だ！

コラトップ®

ジャンボP



コラトップジャンボPは、
いもち病を、速く、長く、
抑え込みます。



※はシンゲンエンタ社の登録商標

コラトップジャンボPなら…

- 畦畔からバックを投げ込むだけ。すぐに拡散し効果がです。
- 散布後、速やかに根から吸収されるので、
散布適期が幅広く出穂5日前まで使えます。

有効成分：ピロキノン…24.0% 毒物及び劇物取締法非該当


適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	ピロキノンを含む 農薬の同時使用回数
稲	いもち病	小包装(バック) 10～13割(500～650g) /10a	穂いもちに対しては 出穂5日前～出穂時 穂いもちに対しては 出穂30日前～5日前まで	2回以内	3回以内 (穂いもち病は1回以内、 本剤では2回以内)



コラトップジャンボPの優れた拡散性

コラトップジャンボPは、着水6～8秒後から水溶性フィルムの溶解がはじまり、
フィルム内の浮遊性基剤が、速やかに水面を浮遊・拡散します。



■使用上の注意事項(抜粋)

- 必要量を購入し、できるだけ速く使うこと。開封後、長期で保管しないように注意してください。
- 本剤は(バック)に使用して、水フィルムは水溶性のため、着水後すぐに溶解し、6～8秒後には水面に拡散し、水田の隅々まで広がります。
- 本剤の用法に当たっては、田水は3cm以上、水田に投入した後は少なくとも3～4日間には田水の入れ替えは必要です。
- 農作物は田水に当たっては、田水は3cm以上、水田に投入した後は少なくとも3～4日間には田水の入れ替えは必要です。
- 本剤は(バック)のまゝ10～13割(500～650g)の割合で水田に均等に投入してください。
- 風や波が強い場合は、散布が不十分となり効果がある可能性があります。特に注意し、特に効果がある場合は、散布方法を調整してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を厳密に、ように注意し、特に効果がある場合は、散布方法を調整してください。

上手な使い方

- 水管理はしっかり！
散布を安定させるために水深を
3cm以上確保してください。



本剤は水溶性であるため、できるだけ早い切っ掛けで、散布した場合は、製品袋の開口を2度折り返し、
テープなどで止めるなど外気との接触を断ち、できるだけ早く使い切ってください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。● 使用後の空袋は田舎などに放置せず適切に処理してください。



農協 全農 経済連

自然に学ぶ 自然を守る
クミアイ化学工業株式会社
本社 千100-8782 東京都東大塚区千1-4-28 TEL:03-3922-5056
ホームページ <http://www.kumiai-chem.co.jp>

※この取組の記載内容は2013年9月現在のものです。

0945115-90

～稲のいもち病防除に～

水稲用殺菌剤

登録商標・特許第2004-2004号
登録商標・特許第2004-2004号

ホクコー ブラスシン[®]粉剤DL

【特長】

- ・ 予防効果と治療効果をあわせもち、散布適期幅が広い。
- ・ ごま葉枯病や変色米など穂枯れ性病害にも有効な総合殺菌剤。

■適用内容

作物名	適用病害名	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) (ずじ葉枯病菌) 変色米 (カーブアラリア菌) (エピコッカム菌)	3～4kg ／10a	収穫7日前 まで	2回以内	散布
	内臓褐変病 稲こうじ病 もみ枯細菌病	4kg／10a			

フェリムゾンを含む農薬の総使用回数：2回以内、フサライドを含む農薬の総使用回数：3回以内

■使用前にラベルをよく読んでください。■ラベルの記載以外には使用しないでください。■本剤は小児の手の届く所には置かないでください。■使用後の空箱は圃場等に放置せず、環境に影響を与えないように適切に処理してください。■防除日誌を記載しましょう。

JAグループ
農協 | 全国 | 経済連



北興化学工業株式会社
〒103-8341 東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号
TEL 03-5561-1111 FAX 03-5561-1112

IP2207A7

®は北興化学工業株式会社の登録商標



2022年8月末日現在の適用内容

LP2309C5

うまい汁は
吸わせない！

キラップ® 粒剤

殺虫剤分類 2B

農林水産省登録 第22078号
有効成分：エチプロール 2.0%
®はバイエルグループの登録商標



【特長】 ○散布適期の幅が広い！ ○粒剤なので散布が楽！

<玄米の着色粒>

玄米の着色粒は、ごく僅かな混入でも生産物の品質や価格に大きな影響を与えます。等級落ちの原因となる着色粒には、斑点米カメムシ類による「斑点米」以外にも、イネシガラセンチュウによる「黒点米」、糸状菌による「変色米」などがあります。近年、斑点米カメムシ類の発生増加にともない、着色粒の主要因が「斑点米」になってきており、大きな問題となっています。



等級	一等米	二等米	三等米
着色粒混入限度 (水稲うるち玄米)	0.1% 以下	0.3% 以下	0.7% 以下

規格外：1等から3等までのそれぞれの品位に適合しないもの（0.7%を超えるもの）

適用害虫および使用方法

2022年12月末日現在の適用内容

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エチプロールを含む農薬の総使用回数
稲	カメムシ類 ウンカ類	3 kg /10 a	収穫14日前 まで	2回以内	灌水散布	2回以内 (は苗時(直播) 又は移植時 までの総回数は 1回以内)



農薬使用時にはラベルをよく読んでください。ラベルの記載以外には使用しないでください。農本剤は小見の書く所には書かないでください。農薬使用後は箱などに放置せず、環境に影響のないよう適宜に処理してください。農薬使用日誌を記録しましょう。



JAグループ

農 協

経済連




北興化学工業株式会社

〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1 日本橋三井ビルディング

<斑点米カメムシ類対策の場合>

キラップ粒剤の散布目安は、**出穂10日前（穂ばらみ期）～出穂期**です。



<水管理>

- ① 散布時は灌水状態（水深3～5cm）とし、水口及び水尻を止めてください。
- ② 散布後、少なくとも4～5日間は灌水状態を保ち、7日間は落水及びかけ流しをしないでください。

<薬剤散布>

圃場全体に均一散布してください。
カメムシ類の発生状況に応じ、追加散布を検討ください。

きP2301A7

病害虫防除剤

本田 病害虫防除剤

農林水産省登録 第4991号 有効成分:MEP---50.0%

ホクコー

スミチオン[®] 乳剤

⑨は住友化学株式会社の登録商標



多くの害虫に効果があり、様々な用途で使用できる。

■適用内容と使用方法 【稲、稲(箱育苗)のみ抜粋】

2023年9月末日現在の適用内容

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (ℓ/10a)	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用方法	MEPを含む 農家の総 使用回数
稲	ニカメイチュウ第1世代	1000~ 2000	60~ 150	収穫 21日前 まで	2回 以内	散布	3回以内(種もみ への処理は1回 以内、育苗箱散 布は1回以内、 本田では2回以 内)
	ニカメイチュウ第2世代、 サカバエヨウ第3世代	800~ 1000					
	ヒトビウカ、カメムシ類、イネハムシ、イネシガレセチュウ、イネトビイロムシ、アブラムシ類、アワヨウ	1000					
	イネモザリハエ	1000~ 2000	25	は種前	1回	8~72時間浸漬 専用の種子消毒機を用い て乾燥種粒重量の3%の量 の希釈液を種粒に吹付け 処理又は浸漬処理	
	イネモザリハエ	2000					
	フサバエヨウ	2000~ 4000					
	ニカメイチュウ、カメムシ類	300	-	収穫 21日前 まで	2回 以内	空中散布	
	イネシガレセチュウ	100					
	ニカメイチュウ、ヒトビウカ、カメムシ類、イネモザリハエ、イネハムシハエ、フサバエヨウ、イネハムシ	30					
	ニカメイチュウ、カメムシ類	8	0.8	育苗期~ 移植前日	1回	無人航空機による散布	
イネシガレセチュウ	1000	育苗箱(60× 30×30cm、使用 土量約5L) 1箱当たり500ml	育苗箱の上から 均一に散布する。				
稲 (箱育苗)							

※スミチオン乳剤は、稲(育苗箱)以外に、麦類、なし(未授精、無雄雄株)、ほうれんそう、ごぼう、たまねぎ、なす、きゅうり、メロン、しゅうりょう、すいか、かぼちゃ、豆類(種、未成熟)、茶、とうもろこし、ばれいしょ、ねぎ、トマト、せり、うど、かんしよ、大根類など、小粒種など、いり、かき、こんにやく、わらび、まめ科牧草、いね科牧草、芝、花き類・観葉植物、樹木類、飼料用とうもろこし、粟など、多くの作物に適用があります。詳しくはラベルをご確認ください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空容器は農機などに放置せず、環境に影響を与えないよう適切に処理してください。●防除日誌を記載しましょう。



※P2310A1

逆側表示

勝利の鍵は、育苗にあった 苗作りのルーティンワーク!



タチガレエース[®]M 粉剤・液剤

タチガレエースM粉剤 125枚分 375枚分

タチガレエースM液剤 100枚分 500枚分

【使用法】 1. 育苗用 2. 移植用 3. 追肥用 4. 追水用 5. 追水用

【効果】 1. 根の生育促進 2. 根の活着促進 3. 根の伸長促進 4. 根の分枝促進 5. 根の老化促進

三井化学クロップ&ライフ
ソリューション株式会社

東京都中央区日本橋1-19-1 日本橋ダイビルディング
ホームページ: <https://www.mc-cropresolutions.com>

タチガレエースM 粉剤・液剤

水稲用植物成長調節剤・殺菌剤

苗立枯病に対して、優れた効果があります。
ムレ苗防止にも有効です。
根の生育促進効果で、根量が増え、根毛がびっしり生えます。
移植時の発根、活着促進に優れています。
冠水や水ストレス、また除草剤による葉害の影響を受けにくくなります。

作物名	適用時期	使用量	使用回数	使用回数	使用回数
稲	苗立枯病、ムレ苗防止、根の生育促進	1000g/ha	1回	1回	1回
麦	根の生育促進	500g/ha	1回	1回	1回
大豆	根の生育促進	500g/ha	1回	1回	1回
雑草	根の生育促進	500g/ha	1回	1回	1回

作物名	適用時期	使用量	使用回数	使用回数	使用回数
稲	苗立枯病、ムレ苗防止、根の生育促進	1000g/ha	1回	1回	1回
麦	根の生育促進	500g/ha	1回	1回	1回
大豆	根の生育促進	500g/ha	1回	1回	1回
雑草	根の生育促進	500g/ha	1回	1回	1回

タチガレエースMは、水稲の苗立枯病、ムレ苗防止、根の生育促進に優れた効果があります。また、麦、大豆、雑草の根の生育促進にも有効です。タチガレエースMは、水稲の苗立枯病、ムレ苗防止、根の生育促進に優れた効果があります。また、麦、大豆、雑草の根の生育促進にも有効です。

三井化学クロップ&ライフ
ソリューション株式会社

東京都中央区日本橋1-19-1 日本橋ダイビルディング
ホームページ: <https://www.mc-cropresolutions.com>

※本製品は水稲の苗立枯病、ムレ苗防止、根の生育促進に優れた効果があります。また、麦、大豆、雑草の根の生育促進にも有効です。タチガレエースMは、水稲の苗立枯病、ムレ苗防止、根の生育促進に優れた効果があります。また、麦、大豆、雑草の根の生育促進にも有効です。

タチガレエースM 粉剤・液剤

三井化学クロップ&ライフ
ソリューション株式会社