

初期除草に 先制のひと振り。

省力で強力。
一発剤、
中期剤のパートナーに！



10a当り
300mℓ散布で
低コスト＆省力化！



シンジェンタ ジャパン株式会社
関東支店（東京）〒104-6021 東京都中央区南洲1-8-10 オフィスタワーX21楼
（ウェブサイト）http://www.syngenta.co.jp



農林水産省登録 第18163号 有効成分：フエチナグロール12.0% 高純度及び新製法製法 非該当

- 一発剤、中期剤との組み合わせで強力除草を実現します。
- ノビエをはじめ一年生広葉雑草に高い効果を示します。
- アゼナ、ホタルイ等のSU抵抗性雑草には体系処理が有効です。
- 容器のまま畦畔から手振り散布できて省力的です。
- 散布適期が幅広く、田植前後の忙しい時期でも余裕を持って使えます。
- 10a当り300mℓ散布で低コスト＆省力化！

適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	水 割 の 使用回数	使用法	フエチナグロールを含む 農薬の散布回数
移植水田	水田一年生雑草 及び マツバ、ホタルイ ヘラオモダカ	移植後～ 移植7日前まで	300mℓ/10a	1回	原液清水 散布	2回以内
		移植直後～ ノビエ1葉期ただし、 移植後30日まで				

上手な使い方（例）

■ 移植～田植が7日以上空く場合。



■ 移植～田植が7日未満の場合。
（移植直後～ノビエ1葉期まで）



取扱い上の注意事項（後詳）

散布後の水管理

- ①散布後少なくとも3～4時間は通常の灌水（3～5cm）を保ってください。
 - ②散布後7日間は灌水、かり流しをしないでください。
- 下記のような条件では、初期生育の抑制を生ずるおそれがあるので使用を避けてください。
- ①砂質土壌の水田及び灌水の大きな水田（灌水深が2cm/日以上）
 - ②乾田を苗を移植した水田。
 - ③機械が通った水田。


- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 使用後の空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

シンジェンタ ジャパン株式会社
〒104-6021 東京都中央区南洲1-8-10 オフィスタワーX21楼
（ウェブサイト）http://www.syngenta.co.jp

※この印刷物の記載内容は2017年5月現在のものです。

2017年5月作成（L1943 TS/YA）

クリアな水田をキープしたい。



藻類
に効く成分
ジメタメトリン
配合

藻類にも強い。
だからなぎ倒しや水温低下も防ぎます。

「稲の生育が悪い」と思うことはありませんか？その原因は、水田の「藻類」かもしれません。

クラールはノビエ、ホタルイなどの一年生雑草に効果を示す

「ブタクロール」だけでなく、藻類の発生を抑える「ジメタメトリン」を配合。

藻類のないクリアな水田を長期間キープするから、

稲のなぎ倒しや、水温低下も防ぎます。




水稲用初期除草剤

クラール^{EW}
1キロ
粒剤

別はご参照

藻類の発生を抑える「ジメタメトリン配合」。クリアな水田を長期間キープします。



クラールEW 500ml/10a

対照剤A 500ml/10a

試験場所：宮城県 大崎市（社内試験）
試験規模：10アール、1連
散布：2016年5月18日
撮影：処理7日後

一年生雑草に強い除草成分「ブタクロール」配合。
ジメタメトリンとの相乗効果により安定して雑草の発生を抑えます。



【適用雑草と使用方法】

作業名	適用雑草名	使用時期	剤型・使用量	本剤及びそれぞれの有効成分を含む製品の総使用回数	使用方法
移植	水田一年生雑草 及び マツハイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズオモダカ アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植後～移植7日前又は 移植後1日～ノビエ1.5葉期 ただし、移植後30日まで	EW: 500ml/10a	本剤：1回	原液潑水散布
稲刈		移植時			田間同時散布機で施用
水		移植後～移植7日前又は 移植後1日～ノビエ1.5葉期 ただし、移植後30日まで	1キロ粒剤: 1kg/10a	ジメタメトリン剤2回以内 ブタクロール剤2回以内	潑水散布又は 無人航空機による散布

●面に付着すると稲葉にダメージを及ぼすことがあるので薬剤を稲葉後に散布する場合は水稲になるべくかからないようにしてください(EW)。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は水田の雑草に効果を示す。●本剤は水田の雑草に効果を示す。

日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号
ホームページ: <https://www.nissan-chem.co.jp/>
お問い合わせ: 03-5561-4211(受付時間: 午前9時～午後5時)

CSR-PR04

根も止める『アルデア』、 待望のパワフル配合！

最大量 10g^{*} 配合。
多年生雑草への効果をより強化した、
新しい『アルデア』剤。

多年生雑草の地上部だけでなく
地下部も抑える除草成分『アルデア』を最大量^{*}配合。
しかも、悩ましいノビエの発生と厄介なSU抵抗性雑草、
そのどちらにもしっかりと対応しています。

※1ヘクタール当たりの最大用量（1077-アルデア）の量です。



水稲用一発処理除草剤



1ヘクタール剤/フロアアル/ジャンボ/顆粒/エアー粒剤




地上部だけでなく
地下部も抑える
除草成分『アルデア』を最大量^{*}配合。

根も止める「アルデア」、待望のパワフル配合！

- 除草成分「アルデア」を最大量10g^{*}配合。
多年生雑草への効果をより強化しました。
- ノビエへの効果持続性、SU抵抗性雑草への効果も強化しています。

「アルデア」を10g/10a配合することで、多年生雑草への効果をより強化しました。

SU抵抗性ホタルイに対する効果




圃場でも効果を確認しています(クロクワイ)



クロクワイに対する効果持続性



ノビエへの効果持続性・SU抵抗性雑草への効果も強化！



適用雑草と使用方法

雑草名	適用時期	使用方法
一年生雑草 及び 多年生雑草	本圃 1回	1ヘクタールあたり 1kg/10a フロアアル剤 500g/10a ジャンボ剤 1kg/10a エアー粒剤 1kg/10a
一年生雑草 及び 多年生雑草	本圃 1回	1ヘクタールあたり 1kg/10a フロアアル剤 500g/10a ジャンボ剤 1kg/10a エアー粒剤 1kg/10a

各種雑草の散布適期

雑草名	散布適期
ノビエ	3月下旬まで
コナギ	3月下旬まで
アザミ	2月下旬まで
ホタルイ	3月下旬まで
ウリカワ	3月下旬まで
ミズギヤウ	3月下旬まで
ヘラオモカ	2月下旬まで
ヒルムシロ	4月上旬まで
セリ	4月上旬まで
オモカ	4月上旬まで
クロクワイ	4月上旬まで
スズイ	4月上旬まで
コナギヤウ	4月上旬まで

※本圃及びそれ以外に散布する場合は、本圃の散布量に準じてください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本圃は小豆の手の届く所には置かないでください。



日産化学株式会社
東京都中央区日本橋二丁目5番1号
TEL: 03-4663-5371 FAX: 03-4663-5372

推奨

除草剤
初・中期・発期

水稻用一発処理除草剤

アピル

アピル®

1キロ粒剤 フロアブル ジャンボ 400FG-NEW

手強い雑草に喝!

**田植同時（キロ粒剤のみ）、
直播水稻、WCS用稲
にも使えます！**

SU抵抗性ホタルイ

クロダワイ

雑草の生育を強く抑制
× 速い効き目

オモダカ



800.277.7774

JAグループ

經濟連

協友アグリ株式会社

東京都中央区日本橋小網町6-1
https://www.kyoyu-agri.co.jp

※フロアブル・ジャンボは田植同時不可

初・中期一発剤

除草剂

水稻用一炷处理除草剂

1キロ短割・フロアブル
ジャンボ・400FG

五

ノビエはもちろん、SU抵抗性ホタルイ、クロダグワイにもしっかりと効果を発揮

- SU域は性雑草(ハタケ、ヨシガサ等)にも高い効果を発揮します。
- クログワウ、オモダカ等の多年生雑草を長期間強く抑制します。
- 効果の発現が速く、長期間持続します。
- FG剤は軽重かつ水面を自己拡散する新しい製剤です。

適用雑草の範囲及び使用方法

[illegible]

△ 使用上の注意事項(一部抜粋)

[illegible]

15 2.08 2015 19:27:24


JAグループ
農協 全国経済連
（C） JA Group 2011/10/10

除草剂

オモダカ



クロクワイ



コウキヤガラ



シスイ



ノビエ



1成分で難防除雑草を狙い撃ち！



処理前	30日後	30日後	30日後	30日後	30日後
 処理前の雑草：オモダカ					

アトトリ[®] 1キロ粒剤

有効成分：ピリミスルファン・0.75%（1キロ粒剤）、3.0%（500g粒剤）

アトトリ 1キロ粒剤 農林水産省登録 第23114号 アトトリ 500g粒剤 第23943号

アトトリ[®] 1キロ粒剤

豆つぶ250

水稲用
中・後期
処理除草剤

1キロ粒剤

[illegible]

ウィードゴアTM 1キロ粒剤
Rinskor^{active}

TM コルテバ・アグリサイエンスならびにその関連会社商標



水稻除稗劑

有效成分

・フロルドラウキシフェンンジル(通称:リンズコア) 0.40%、ペノキススラム 0.50%、ベンゾピシクロン 2.0%

- ・すばやい効果発現
症状(検査など)が早く現れ、効果の判断がしやすいです。
- ・4葉期のノビエと大きな広葉雑草に優れた効果
散布適期の幅が広く、生育の進んだ雑草にも有効です。
- ・様々な雑草を同時に防除可能
既存剤に感受性が低下した雑草、イボクサやクサネムなどの難防除雑草、セリやオモダカなどの多年生雑草まで、幅広い草種をこの剤一つで防除できます。

【適用内容】

適用作物名		適用雑草名	使用時期	使用量 (10a当たり)	本剤の使用回数	使用方法
移穂水稲	一年生雑草 及び キシノウエスズメノヒ 多年生広葉雑草	移穂後7日 ～ノビエ4葉期 但し、 収穫60日前まで	1kg	2回以内	本剤2回以内	灌水散布 又は 無人航空機 による散布
直播水稲	一年生雑草 及び ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ セリ ヒルムシロ	稲3葉期 ～ノビエ4葉期 但し、 収穫60日前まで				

■主な雑草の防除目安

シズイ	約20cmまで	
イボクサ	約40cmまで	
クサネム	約30cmまで	
オモダカ	約30cmまで	
コナギ	心形葉2度開まで	
ホタルイ	イ城跡まで	
ノビエ	4度開まで	

* 移植水曜のみ

■使用時期の目安(移植水稻の場合)

初噴剤
一発剤

WCS

WCSで適用可能

直播水稻に適用あり

無人航空機散布に対応




水稻用中後期除草劑

ウイードコアTM 1キロ粒剤
RinskorTM active



従来、粒剤で防除が困難であった草種に対しても優れた除草効果を示します。
素早い効果発現を実感してください。

■各種雑草に対する殺草効果(2020年試験実施・栃木県)

	クサネム	イボクサ	オモダカ	コナギ	アゼナ	ノビエ
散布 直前						
						
散布 4日後						
						
散布 9日後						
						
散布 18日後						

【使用上の注意】

[illegible]

【杭州六上历史】

[illegible]

●使用前には、ラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

JAグループ
農協 協同 経済連

北興化学工業株式会社
〒114-8546 東京都荒川区西日暮里5-1-1 日暮里駅前ビル1F

5P221286

