



インゲン豆の直播栽培

■栽培特性

1. マメ類の中でも高温好み、生育適温は20℃～25℃くらいです。
2. 生育期間が短く、他の野菜との間作として十分利用できる野菜です。
3. 土壌水分に比較的敏感に反応するので、排水と過乾燥に注意してください。

1 品種

つる有り種とつる無し種に分かれます。つる有り種は収穫期間が比較

的に長くて多収ですが、支柱が必要になります。

つる無し種は短期間に収穫でき、狭い場所でも栽培できます。

2 ほ場準備

種まきの2週間前に、ふりかけ堆肥工口300g/m²、苦土消石灰120g/m²、BMよりりん40g/m²を全層施用し荒起します。基肥として播種5日前に野菜有機S282を100g/m²施用し整地して準備します。

3 種まき

6月初旬から7月中旬まで畑に直まきできます。株間30cmで1か所3粒まきとし、覆土は約3cmとします。

3cm 手の
1か所に3粒種をまきの厚さに土をかぶせ、ひらで軽くおさえる。



本葉2～3枚の


ときに間引きし2

本にします。根は

加湿に弱いので排


水対策として畦は

やや高めにします。



4 管理・収穫

つる有り種については、下から3枚目までの葉の付け根から出るわき芽は取り除き、親づるを支柱に誘引していきます。支柱には50cmおきに横にもひもを張り、側枝がからみやすいようにします。



つる有り種

つる無し種より子実のふくらみが大きくなっても食味は落ちにくいので、収穫適期の幅はやや広い。

つる無し種

開花後10～15日の子実のふくらみがさやにあらわれてきたころ収穫する。

⚠️ PCB (ポリ塩化ビフェニル) を含む廃棄物の適正処理について

【安定器等・汚染物の処理に関する割引制度が実施されます】

このたび、PCB 廃棄物のうち、JESCO 北九州での処理対象となっている安定器等・汚染物について、処分費用の3%が割り引かれる制度(特別登録)が実施されます。

この割引制度の利用には、平成29年7月～12月の半年間にJESCOへ登録を行うことが必要です。この機会に、事業所内の照明器具や倉庫などを点検し、PCBを含む機器がないか、再度ご確認ください。

※割引制度の登録期間は、自治体により異なります。滋賀県以外で保管されている安定器等・汚染物の登録期間については、保管場所を管轄する自治体へお問い合わせください。

お問い合わせ先／滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課 TEL: 077-528-3474